

最上地区

交通死亡事故ゼロ期間9か月更新中!

最上地区では令和5年6月1日以降、交通死亡事故が発生しておらず、令和6年3月2日で交通死亡事故ゼロ期間9か月を更新しています。

最上地区の交通死亡事故ゼロ期間の過去最長は、9か月22日間
で、令和6年3月24日で過去最長を記録します。

みんなで安全運転を心掛けよう!

【事故防止のポイント】

最上地区の死亡・重傷事故の特徴から

- 幹線道路（国道や県道）で約7割発生
 - 緊張感を持って、速度を守った安全運転を!
 - 夜間に高齢歩行者横断中の事故が多い
 - 道路横断時は左右確認、夜光反射材の着用を!
 - 高齢ドライバーの発生が多い
- 地域・職場・家庭から交通事故防止の呼びかけを!



みんなで 交通ルールを守ろう!
一人一人の心がけて交通事故をゼロにしよう

春の全国交通安全運動
令和6年4月6日①～4月15日②
4月10日②は「交通事故ゼロを目指す日」です



かモンくん

その植物、 本当に食べて 大丈夫？



山菜や野菜とまちがえて**有毒植物**を食べ、**食中毒**になることがあります。

食中毒にならない心構え

食用と確実に判断できない植物は
採らない、食べない、売らない、譲らない！




- ✓ 確実に食べられるとわかるものだけ採りましょう。
- ✓ 山菜と有毒植物が混在していることが多いので、採る際は慎重に！
- ✓ いただきものは見た目や匂いで判断できない場合、**食べない選択を！**
- ✓ 有毒植物と食用植物は**区別して植えましょう。**

まちがえやすい有毒植物

有毒 スイセン

- ニラのような匂いはない
- 丸型の球根がある
- 食中毒症状：食後30分以内で吐き気、おう吐、頭痛、下痢、流涎、発汗、昏睡、低体温など




家庭菜園で、
ニラとスイセンを
誤って収穫
してしまうことも！



有毒 トリカブト

- 茎に柄が交互についている
- ニリンソウと混在している場合もある
- 食中毒症状：食後10～20分以内で、口唇や舌のしびれ、手足のしびれ、おう吐、腹痛、下痢、血圧低下など



資料提供：山形県衛生研究所

山菜等を食べて体調に異常を感じたら、残品を持って早急に医療機関を受診しましょう。

お問合せ：山形県 防災くらし安心部 食品安全衛生課 TEL：023-630-2677